

Résultats du questionnaire sur les dyslipidémies

CNCH octobre 2017

Questionnaire internet

108 réponses

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.


Un homme de 50 ans est en USIC pour un NSTEMI

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Q1 Lors d'un syndrome coronarien aigu, quand demandez-vous le bilan lipidique ?

Réponses obtenues : 107 Question(s) ignorée(s) : 1



CHOIX DE RÉPONSES

Il fait partie du bilan systématique d'entrée

Il ne fait pas partie du bilan systématique d'entrée

le patient doit être à jeun pour ce prélèvement

Nombre total de participants : 107

RÉPONSES

68,22% 73

17,76% 19


39,25% 42

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Q2 Quel traitement hypolipémiant prescrivez-vous ?

Réponses obtenues : 107 Question(s) ignorée(s) : 1



CHOIX DE RÉPONSES

fortes doses de statines quel que soit le bilan lipidique

doses intermédiaires de statines quel que soit le bilan lipidique et adaptation lors des consultations de suivi

il vous arrive de débiter par une association statine + ezetimibe

vous adaptez le traitement aux résultats du bilan lipidique pendant l'hospitalisation

Nombre total de participants : 107

RÉPONSES

79,44% 85


16,82% 18

1,87% 2

14,95% 16

Q3 Lors de la sortie, précisez-vous la durée de la double anti agrégation plaquettaire sur la lettre de liaison ou l'ordonnance ? (une réponse)

Réponses obtenues : 105 Question(s) ignorée(s) : 3




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
rarement ou jamais	7,62%	8
souvent	32,38%	34
toujours	60,00%	63
TOTAL		105

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Q4 Lors de la sortie, précisez-vous l'objectif du LDL cholestérol sur la lettre de liaison ou l'ordonnance? (une réponse)


Réponses obtenues : 103 Question(s) ignorée(s) : 5



CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
rarement	42,72%	44
souvent	32,04%	33
toujours	25,24%	26
TOTAL		103

Q5 On dit du LDL après un infarctus : "the lower, the better". En dehors du sujet âgé, vous arrive t-il d'alléger le traitement hypolipémiant car le LDL est trop bas lors du suivi ?

Réponses obtenues : 106 Question(s) ignorée(s) : 2



CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
oui	49,06%	52
non	46,23%	49
Autre (veuillez préciser)	4,72%	5
TOTAL		106

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

0,48 litre g/litre

Q6 Si vous avez répondu "oui" à la question précédente, quelle est "votre limite inférieure pour le LDL". Faites coulisser le curseur vers cette valeur approximative

Réponses obtenues : 53 Question(s) ignorée(s) : 55




CHOIX DE RÉPONSES	MOYENNE	TOTAL	RÉPONSES
		50	2 649
Nombre total de participants : 53			53

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Q7 Ce patient de 50 ans, hospitalisé pour un SCA, a un LDL à 2 g/l. Recherchez vous des xanthomes tendineux ?

Réponses obtenues : 106 Question(s) ignorée(s) : 2




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
toujours	24,53%	26
parfois	45,28%	48
jamais	30,19%	32
TOTAL		106

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Q8 Chez un coronarien de 50 ans avec un LDL à 2 g/l, donnez-vous une information destinée à ses enfants?

Réponses obtenues : 107 Question(s) ignorée(s) : 1




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
toujours	22,43%	24
souvent	34,58%	37
rarement	28,04%	30
jamais	14,95%	16
TOTAL		107

Un homme de 55 ans a une
cardiopathie stable depuis un SCA
en 2013

Q13 Vous le voyez pour la première fois en consultation. Il reçoit atorvastatine 40 mg. Voici son bilan lipidique : HDL= 0,45 g /litre, LDL 0,95 g /litre. Que faites-vous avec le traitement hypolipémiant ?


Réponses obtenues : 104 Question(s) ignorée(s) : 4



CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
même traitement	32,7%	34
augmentation de la dose de statine	38,46%	40
association à ezetimibe	28,85%	30
TOTAL		104

Q14 Vous découvrez qu'il a une sténose à 50% de la carotide et une HbA1C à 8%. Que faites-vous du traitement hypolipémiant ?

Réponses obtenues : 103 Question(s) ignorée(s) : 5




CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	NOMBRE
même traitement	18,49%	19
augmentation de la dose de statine	47,57%	49
association à Ezetimibe	33,98%	35
TOTAL		103

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Q16 Dans l'HTA, les médecins s'acharment à atteindre les objectifs tensionnels et beaucoup de patients ont une polythérapie. Chez le coronarien, les statines ne sont pas toujours données à fortes doses et une minorité de patients reçoit une association statine/ezetimibe malgré des objectifs non atteints dans environ un tiers des cas. Comment expliquez vous cette différence de prise en charge ?

Réponses obtenues : 102 Question(s) ignorée(s) : 6



CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
les médecins sont moins convaincus par les "cibles" du LDL que dans l'HTA	65,69%	67
les recommandations sur les dyslipidémies sont trop compliquées	26,47%	27
les campagnes médiatiques contre les statines nous influencent même inconsciemment	55,88%	57
il existe une inertie thérapeutique	45,10%	46
un LDL trop bas peut être dangereux	5,88%	6

2017 © 23^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.