






REDUCER

Quel retour d'expérience avec une première trentaine de patients traités



Sahbi FRADI
Hôpital Marie Lannelongue



DÉCLARATION DE LIENS D'INTÉRÊT POTENTIELS

Intervenant : Mohamed Sahbi FRADI, Le Plessis Robinson

- Je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer

Cas clinique : Mr G, 70 ans


- FRCV: HTA, Dyslipidémie, DNID
- Endartéiectomie de la CIG
- IRC





PAC x 2 en 2000 : AMIG – IVA II et AMID – CD (occlus) ATC de la Cx , de la CD avec des RIS itératives

2023 © 29^{eme} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.




*Angor réfractaire malgré un traitement
médical optimal*




2023 © 29^{eme} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

REDUCER



2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.




2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Amélioration clinique spectaculaire au-delà de 2 mois




Expérience du centre


- 35 patients
 - Age moyen: 74 ans



Symptômes




Atteintes coronaires




Résultats Cliniques

Angor CCS




Dyspnée



- Ambulatoire
- Sous AL
- Durée moyenne : 30 min
- Courbe d'apprentissage : assez rapide
- Très **sure** +++

Procédure

Voie d'abord : Voie jugulaire



Voie basilique

2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Voies d'abord

Veine axillaire

Veine céphalique

Veine à utiliser en dernier recours

Veine brachiale = humérale

Veine à utiliser en seconde intention

Veine médiane cubitale



R33.

Veine basilique

Voie d'abord à privilégier




Voie veineuse basilique





MP 4F 65 cm





2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.







2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.



2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

Voie veineuse basilique




Avantages:

- Confort Patient / Opérateur
- Moins irradiante


Limites:

- longueur du cathéter
- Taille du patient
- Valve infranchissable



Voie d'abord

2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.








Rare :
-Embolisation,
-Perforation

Difficultés techniques

Complications





CSO lumen ■ Thebesian valve






2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.




2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.





2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.



Embolisation





2023 © 29^{eme} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.




2023 © 29^{eme} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.



Embolisation



Embolisation





2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.


Mr. G







2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.



Mr B








Mr B





INOCA ?





Conclusion

- Le Réducteur de sinus : bonne option thérapeutique pour l'angor réfractaire efficace et sûre
- Amélioration clinique, augmentation du flux coronaire et diminution des résistances microvasculaires
- Précieux pour le traitement des misères coronaires mais pas que



Conclusion

Coronary Angiography in Patients With Refractory Angina


Microvascular angina




Limited territory at risk



Diffuse thread-like atherosclerosis



End-stage CAD



2023 © 29^{eme} Congrès du CNCH. Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.





2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.

MERCI



2023 © 29^{ème} Congrès du CNCH, Tous droits réservés - Toute reproduction même partielle est interdite.



@CNCHcollege



Suivez le CNCH sur le Social Média !

#CNCHcongres



@CNCHcollege



Collège
National des
Cardiologues des
Hôpitaux



@CNCHcollege



Si vous voulez devenir Ambassadeur social média CNCH adressez-nous un email à cnch@sfcardio.fr