



RICAI

RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Ajuster le recours à l'antibiothérapie en médecine générale : résultats intermédiaires d'une action pilote régionale de travail de pairs à pairs



Formation Médicale Continue 34
Maison des Professions Libérales
285 rue Alfred Nobel - 34000 MONTPELLIER
Tél/fax: 04.67.70.86.62
FMC34@orange.fr - <http://www.fmc34.fr/>

Dr^s Lucie KUHMEI et Maguelone DE SESMAISONS

Mardi 18 Décembre 2018







RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Grive, son développement et ses actions





RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Grive



Optimiser les prescriptions d'antibiotiques / diminuer les prescriptions
des antibiotiques les plus pourvoyeurs de résistances



Informez sur la vaccination, les pathologies émergentes, limiter la diffusion des BMR



Travailler les représentations des soignants, des patients



RICAI 2018


38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Grive

Rencontres
pairs à pairs

Rencontre des
autres acteurs
de santé

Interventions
public



Calendrier 2017-2018
Mieux prescrire, moins prescrire



Si rien ne change, en 2050
la résistance des bactéries
aux antibiotiques
tuera plus que le cancer

Pour préserver l'efficacité des antibiotiques,
STOP aux prises systématiques.

Antibiorésistance, Agissons !

En Sancer plus

© RICAI 2018 Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite.



RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Matériel et Méthode

- Recherche-action
- Evaluation prospective
- Comparative
- Médecins rencontrés par un référent / groupe témoin de prescripteurs du même territoire





RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

- Entre 01/16 et 03/18
- 15 médecins généralistes sont devenus référents en infectiovigilance extra hospitalière





RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Analyse



- Quantitative et qualitative (par la DRSM)
- Des prescriptions saisonnières
- Anonymisée
- Suivi des DDJ / 1000 patients par molécule ciblée
- De manière trimestrielle depuis 2015



RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Résultats

335 médecins
rencontrés sur 2,5 ans :

- 98 en 2016
- 112 en 2017
- 235 en 2018






Distribution des patientèles Exposés/Non exposés


Distribution des patientèles Exposés/Non exposés:

Figure 1 Distribution de la patientèle des PS Exposés



Quantiles	
Quantile	Valeur estimée
Max 100%	1980
99%	1520
95%	1266
90%	1044
Q3 75%	857
Médiane 50%	682
Q1 25%	467
10%	329
5%	71
Min 0%	1

Figure 2: Distribution de la patientèle des PS NON Exposés



Quantiles	
Quantile	Valeur estimée
Max 100%	2881.0
99%	1808.0
95%	1319.0
90%	1124.0
Q3 75%	859.0
Médiane 50%	622.5
Q1 25%	376.0
10%	135.0
5%	43.0
1%	1.0
Min 0%	1.0

=> Pas de différence significative




RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Resultats, origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon

DDJ Moyennes d'antibiotiques prescrites par jour pour 1000 patients par trimestre pour les Exposés et les Non Exposés



⇒ Différence significative ($p=0,0336$) entre formés et non formés,
et ce aux différents trimestres




RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Resultats, origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon

EVOLUTION PAR CLASSE D'AGE													
FORMES	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017	T2 2017	T3 2017	T4 2017	T1 2018
0 - 8 ans	20,0	15,8	11,6	18,8	19,6	13,5	13,3	16,1	17,6	14,2	10,0	17,0	15,2
8 -75 ans	28,3	18,8	17,5	22,9	26,0	19,3	16,6	24,0	25,7	18,0	16,5	20,1	21,7
+ 75 ans	33,3	19,7	18,7	26,3	29,4	20,1	17,3	30,6	35,6	19,7	17,5	22,6	27,3
PS NON FORMES	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017	T2 2017	T3 2017	T4 2017	T1 2018
0 - 8 ans	26,8	20,2	15,8	26,8	28,1	20,5	14,3	26,8	24,8	19,8	15,5	27,8	23,9
8 -75 ans	35,4	22,5	22,0	29,2	34,5	23,9	20,8	32,6	32,9	22,5	22,1	28,7	30,0
+ 75 ans	35,4	21,2	20,7	23,3	33,5	23,6	20,0	31,8	36,4	21,5	20,7	29,1	32,3



=> -25% vs -12% / -18% vs -9%

=> Significativité non mesurée

© RICAI 2018 Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite.

© RICAI 2018 Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite.

© RICAI 2018 Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite.





RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Résultats, origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon

Amoxicilline-acide clavulanique

AMOXICILLINE ET INHIBITEUR D'ENZYME



ddj pour 1000 patients par jours

$p < 0,0001$

=> Diminution significative des prescriptions d'amoxi-clav chez les médecins formés




RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse


Resultats, origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon

Répartition par regroupement de molécules

Par regroupement de molécules - PS formés



Par regroupement de molécules - PS non formés



=> Diminution des prescriptions d'Amoxi-clav au profit de l'amoxicilline




RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Resultats, origine SNIIRAM, DRSM Languedoc Roussillon


C3G et quinolones

C3G




ddj pour 1000 patients par jours

p = 0.18 Non significatif




p = 0.95 Non significatif

QUINOLONES



ddj pour 1000 patients par jours



=> Pas de différence significative entre les groupes mais baisse globale des prescriptions



RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Biais



Biais de sélection des exposés



Biais de saisonnalité



Action des DAM en parallèle



Actions non mesurables : grand public, écoles



RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Conclusion



Pertinence, faisabilité et évaluation positive



Evaluation comparative coût/efficacité non disponible



Reproductibilité possible dans d'autres régions



RICAI 2018

38ème Réunion Interdisciplinaire
de Chimiothérapie Anti-Infectieuse

Merci pour votre attention !



Pour plus d'informations :

- www.grive-occitanie.fr
- reseaugrivelr@gmail.com

